

## Ergebnisse des AK Bundesgehölzsichtungung - *Hamamelis*

### Die Ergebnisse – kurzgefasst

Das 33 Sorten bzw. Cultivare umfassende *Hamamelis*-Sortiment, das vom Arbeitskreis Bundesgehölzsichtung zwischen 2016 und 2020 geprüft wurde, bestand überwiegend aus der *Hamamelis x intermedia*-Gruppe. Abweichend waren nur die Sorten 'Amethyst', 'Quasimodo' (Zwergform), 'Sandra' und 'Washington Park' der nordamerikanischen Art *Hamamelis vernalis* zuzuordnen. Am Ende der Sichtung hat der Arbeitskreis die vier Sorten 'Angelly', 'Barmstedt Gold', 'Jelena' und 'Orange Beauty' mit drei Sternen als ausgezeichnet bewertet. Diese vier Cultivare dürfen damit zukünftig das Gütezeichen „Premiumgehölz der Bundesgehölzsichtung“ tragen. Aber auch die meisten anderen geprüften Sorten zeigten sich als äußerst hochwertig. So wurden 17 Sorten mit „sehr gut“ bewertet (= \*\*), acht mit „gut“ (= \*), zwei als „Liebhaber Sorte“ (= s) und lediglich zwei als „entbehrlich“ (= o) eingestuft (mehr Infos unter [www.gehoelzsichtung.de](http://www.gehoelzsichtung.de))

### Versuchsfrage und Versuchshintergrund

Gartenstandorte innerhalb Deutschlands sind naturgemäß hinsichtlich Boden- und Klimateigenschaften sehr verschieden. Basieren Informationen zu Pflanzen-/Sorteneigenschaften auf Einzelstandortbeobachtungen unter optimalen Bedingungen, ist die Wahrscheinlichkeit groß, dass sich die Pflanze beim Verwender anders oder schlechter entwickelt und es in der Folge zu Enttäuschungen kommt. Deshalb wird im Rahmen der Bundesgehölzsichtung an mittlerweile bis zu 12 deutschen Standorten über mehrere Jahre ein gemeinsames Sortiment getestet.

Sorten die sich dabei an der Mehrzahl der Standorte als robust und attraktiv erweisen, werden dies mit großer Wahrscheinlichkeit auch an den meisten Endstandorten zeigen (ein Mindestmaß an Pflege vorausgesetzt). Abschließend werden die Sorten mit ein, zwei oder drei Sternen benotet, je nachdem ob sie sich gut, sehr gut oder ausgezeichnet entwickelten. Auch spezielle (meist für Liebhaber) oder entbehrliche Sorten werden gekennzeichnet.

Von der Gattung *Hamamelis* sind laut NAMENLISTE GEHÖLZE (2021) ca. 70 verschiedene Sorten bzw. Cultivare bekannt, die gegenwärtig in Europa mehr oder weniger häufig kultiviert werden, von denen rund 50 der Hybridart *H. x intermedia* zugerechnet werden. LANE (2021) beschreibt auf seiner Homepage sogar über 120 bekannte Cultivare, 70 allein für *H. x intermedia*. Die meisten Cultivare werden in Europa durch Veredelung vermehrt, wobei *Hamamelis virginiana* die am häufigsten verwendete Unterlage darstellt, auf die das Edelreis



**Abb. 1:** Prüfstandorte des AK Bundesgehölzsichtung

## Ergebnisse des AK Bundesgehölzsichtung - *Hamamelis*

entweder kopuliert oder seltener Augen okuliert werden. Sie werden später zumeist als zwei- bis vierjährige Veredelungen im C3 bis C10 stehend vermarktet.

Um dem Verbrauchern in Deutschland einfache Empfehlungen über gute und gesunde Sorten geben zu können, wurde die Sichtung des Zaubernussortiments gestartet. Das schien dem AK Bundesgehölzsichtung als angeraten, da in Europa derzeit 70 Zaubernuss-Sorten in Kultur sind und in der Summe 120 Sorten bekannt sind, was dem Verbraucher die Orientierung und den direkten Weg zu guten Sorten sehr erschwert.



**Abb.2:** Das Gütezeichen weist dem Verbraucher den Weg zu den besten Sorten im Gehölzsortiment

Der Name Zaubernuss (botanisch *Hamamelis*) geht vermutlich darauf zurück, dass amerikanische Einwanderer aus Europa Astgabeln von *Hamamelis virginiana* L. als Wünschelrute benutzt haben. Da der Strauch mit seinem Habitus, seinem Laub und seinen Früchten die Einwanderer außerdem an die europäische Haselnuss erinnerte, könnte sich daraus der englische Trivialname „Witch Hazel“ (= Hexen-Hasel) erklären, woraus im deutschsprachigen Raum dann „Zaubernuss“ wurde.

### Ergebnisse im Detail

Bereits Anfang Dezember blühen ‘Robert’ und ‘Rochester’. Die spätesten Sorten im Test waren ‘Duftzauber’ und ‘Sandra’. Die Sorten ‘Doerak’ und ‘Ostergold’ beenden als letzte Ihre Blühphase. Eine ausgesprochen lange Blühdauer von rund 12 Wochen zeigen die bereits früh im Winter blühenden Sorten

Ergebnisse des AK Bundesgehölzsichtungung - Hamamelis

'Moonlight', 'Old Copper', 'Robert', 'Rochester' und 'Orange Beauty'. Das kürzeste Durchhaltevermögen mit etwas über 6 Wochen zeigen die Blüten der spätesten Sorte 'Sandra'. Der Blütezeitkalender in Abb. 3 charakterisiert die geprüften Sorten bezüglich Blühbeginn, Blühdauer und Blühende auf Basis des „Mittelwerts“ über die beteiligten Prüfstandorte. Die Vollblüte datierte meist 2 bis 3 Wochen nach dem Blühbeginn. Der genaue Blühbeginn einer Sorte hängt natürlich von den jeweils aktuellen Bedingungen am jeweiligen Standort ab.






Abb. 3: Blühzeitenkalender (inklusive Auf- und Verblühphase) der geprüften Zaubernuss-Sorten im Mittel über alle Sichtungstandorte. Die Balkenfarbe zeigt den Hauptfarbton der Blüten

Ergebnisse des AK Bundesgehölzsichtung - Hamamelis

Am Ende der Sichtung hat der Arbeitskreis Bundesgehölzsichtung die vier Sorten ‘Angelly’, ‘Barmstedt Gold’, ‘Jelena’ und ‘Orange Beauty’ mit drei Sternen als ausgezeichnet bewertet. Diese vier Cultivare dürfen damit zukünftig das Gütezeichen „Premiumgehölz der Bundesgehölzsichtung“ tragen (Abb. 2), das dem Verbraucher das Auffinden von Gehölzsorten mit hoher Qualität auch im Handel erleichtern soll, sofern die entsprechenden Gehölze damit ausgezeichnet sind. Aber auch die meisten anderen geprüften Sorten zeigten sich als äußerst hochwertig. So wurden 17 Sorten mit „sehr gut“ bewertet (= \*\*), acht mit „gut“ (= \*), zwei als „Liebhaber Sorte“ (= s) und lediglich zwei als „entbehrlich“ (= o) eingestuft, wie aus Tabelle 1 hervorgeht, wo die Sorten beschrieben werden und die Bewertung des Arbeitskreises Bundesgehölzsichtung aufgeführt sind. In Tabelle 2 sind die Blüten der geprüften Sorten aufgeführt, sodass die Farbvielfalt der geprüften Sorten mit allen Nuancen vorstellbar wird.

**Tab. 1:** Beschreibung der Eigenschaften der Sorten sowie deren abschließende Bewertung. \* = gute Sorte; \*\* = sehr gute Sorte; \*\*\* = ausgezeichnete Sorte; s = Liebhaber Sorte; o = entbehrliche Sorte. NL = Bewertung im Rahmen einer Sichtung im Jahr 2002 in den Niederlanden (HOUTMANN und VAN DER WERF 2002), UK = Bewertung der RHS im Rahmen des Award of Garden Merit (AGM) 2006 (RHS 2021)

Art/Cultivar/Sorte	Blüte	Wuchs	Laub	Bewertung
<i>H. x intermedia</i> ‘Advent’	Blütezeit: KW 52-10; Dauer: 10 Wochen; Auffälligkeit: hoch; Reichblütigkeit: stark; Dekorative Wirkung: hoch; Vorblüte: fehlend – gering; Duft: fehlend – gering; Farbe: gelb; Fruchtansatz: gering	Wuchsform: straff aufrecht; Wüchsigkeit: gering; Höhe: 115 (135); Breite: 125 (175); Verzweigung/Dichte: dicht	Dekorative Wirkung Herbstlaub: mittel; Anhaften des Laubs im Winter: kein	**  NL = **, UK = AGM
<i>H. x intermedia</i> ‘Allgold’	Blütezeit: KW 52-11; Dauer: 11 Wochen; Auffälligkeit: hoch; Reichblütigkeit: stark; Dekorative Wirkung: hoch; Vorblüte: fehlend – gering; Duft: gering; Farbe: gelb; Fruchtansatz: gering	Wuchsform: breit buschig; Wüchsigkeit: stark; Höhe: 115 (160); Breite: 155 (230); Verzweigung/Dichte: dicht	Dekorative Wirkung Herbstlaub: mittel; Anhaften des Laubs im Winter: gering	*
<i>H. vernalis</i> ‘Amethyst’	Blütezeit: KW 52-11; Dauer: 11 Wochen; Auffälligkeit: mittel; Reichblütigkeit: stark; Dekorative Wirkung: mittel; Vorblüte: fehlend – gering; Duft: gering; Farbe: rotviolett; Fruchtansatz: gering	Wuchsform: straff aufrecht; Wüchsigkeit: gering; Höhe: 115 (210); Breite: 100 (160); Verzweigung/Dichte: dicht	Dekorative Wirkung Herbstlaub: mittel; Anhaften des Laubs im Winter: gering	*
<i>H. x intermedia</i> ‘Angelly’	Blütezeit: KW 5-12; Dauer: 10 Wochen; Auffälligkeit: hoch; Reichblütigkeit: stark; Dekorative Wirkung: hoch; Vorblüte: fehlend – gering; Duft: fehlend – gering; Farbe: gelb; Fruchtansatz: gering	Wuchsform: straff aufrecht; Wüchsigkeit: gering; Höhe: 95 (130); Breite: 90 (140); Verzweigung/Dichte: locker	Dekorative Wirkung Herbstlaub: mittel; Anhaften des Laubs im Winter: kein	 ***  NL = s-*, UK = AGM
<i>H. x intermedia</i> ‘Arnold Promise’	Blütezeit: KW 5-12; Dauer: 7 Wochen; Auffälligkeit: hoch; Reichblütigkeit: stark; Dekorative Wirkung: hoch; Vorblüte: fehlend; Duft: gering; Farbe: gelb; Fruchtansatz: gering	Wuchsform: kompakt; Wüchsigkeit: gering; Höhe: 110 (150); Breite: 140 (190); Verzweigung/Dichte: dicht	Dekorative Wirkung Herbstlaub: hoch; Anhaften des Laubs im Winter: kein	**  NL = ***, UK = AGM
<i>H. x intermedia</i> ‘Barmstedt Gold’	Blütezeit: KW 3-13; Dauer: 10 Wochen; Auffälligkeit: sehr hoch; Reichblütigkeit: stark; Dekorative Wirkung: hoch; Vorblüte: gering; Duft: gering; Farbe: goldgelb; Fruchtansatz: gering	Wuchsform: breit buschig; Wüchsigkeit: stark; Höhe: 140 (200); Breite: 170 (245); Verzweigung/Dichte: locker	Dekorative Wirkung Herbstlaub: mittel; Anhaften des Laubs im Winter: kein	 ***  NL = **, UK = AGM

Ergebnisse des AK Bundesgehölzsichtung - Hamamelis

H. x intermedia 'Bernstein'	Blütezeit: KW 1-12; Dauer: 11 Wochen; Auffälligkeit: hoch; Reichblütigkeit: stark; Dekorative Wirkung: hoch; Vorblüte: fehlend; Duft: mittel; Farbe: orangegelb; Fruchtansatz: gering	Wuchsform: straff aufrecht; Wüchsigkeit: gering; Höhe: 140 (220); Breite: 140 (190); Verzweigung/Dichte: locker	Dekorative Wirkung Herbstlaub: mittel; Anhaften des Laubs im Winter: gering	**
H. x intermedia 'Brandis'	Blütezeit: KW 2-12; Dauer: 10 Wochen; Auffälligkeit: hoch; Reichblütigkeit: stark; Dekorative Wirkung: hoch; Vorblüte: gering; Duft: gering; Farbe: gelb; Fruchtansatz: gering	Wuchsform: breit buschig; Wüchsigkeit: stark; Höhe: 140 (220); Breite: 175 (260); Verzweigung/Dichte: locker	Dekorative Wirkung Herbstlaub: mittel; Anhaften des Laubs im Winter: gering	**
(Syn. 'Brandes')				
H. x intermedia 'Cyrille'	Blütezeit: KW 1-12; Dauer: 11 Wochen; Auffälligkeit: hoch; Reichblütigkeit: stark; Dekorative Wirkung: mittel; Vorblüte: fehlend - gering; Duft: gering; Farbe: gelb mit rötlicher Basis; Fruchtansatz: gering	Wuchsform: kompakt; Wüchsigkeit: sehr gering; Höhe: 105 (180); Breite: 125 (210); Verzweigung/Dichte: dicht	Dekorative Wirkung Herbstlaub: mittel; Anhaften des Laubs im Winter: kein	*
H. x intermedia 'Diane'	Blütezeit: KW 2-12; Dauer: 9 Wochen; Auffälligkeit: hoch; Reichblütigkeit: stark; Dekorative Wirkung: hoch; Vorblüte: fehlend - gering; Duft: fehlend - gering; Farbe: rot; Fruchtansatz: gering	Wuchsform: breit buschig; Wüchsigkeit: stark; Höhe: 120 (175); Breite: 155 (230); Verzweigung/Dichte: dicht	Dekorative Wirkung Herbstlaub: hoch; Anhaften des Laubs im Winter: gering	** NL = **, UK = AGM
H. 'Doerak'	Blütezeit: KW 3-14; Dauer: 11 Wochen; Auffälligkeit: hoch; Reichblütigkeit: stark; Dekorative Wirkung: mittel; Vorblüte: fehlend - gering; Duft: stark; Farbe: dunkelgelb; Fruchtansatz: mittel	Wuchsform: breit buschig; Wüchsigkeit: stark; Höhe: 115 (170); Breite: 155 (240); Verzweigung/Dichte: sehr dicht	Dekorative Wirkung Herbstlaub: mittel; Anhaften des Laubs im Winter: stark	o NL = **
H. x intermedia 'Duftzauber'	Blütezeit: KW 6-13; Dauer: 7 Wochen; Auffälligkeit: mittel; Reichblütigkeit: stark; Dekorative Wirkung: mittel; Vorblüte: gering; Duft: mittel; Farbe: gelborange, Spitzen gelb; Fruchtansatz: mittel	Wuchsform: breit buschig; Wüchsigkeit: sehr gering; Höhe: 90 (125); Breite: 105 (160); Verzweigung/Dichte: locker	Dekorative Wirkung Herbstlaub: mittel Anhaften des Laubs im Winter: gering	**
H. x intermedia 'Feuerzauber'	Blütezeit: KW 1-10; Dauer: 9 Wochen; Auffälligkeit: mittel; Reichblütigkeit: mittel; Dekorative Wirkung: mittel; Vorblüte: fehlend - gering; Duft: gering; Farbe: orangerot; Fruchtansatz: gering	Wuchsform: straff aufrecht; Wüchsigkeit: gering; Höhe: 140 (190); Breite: 145 (190); Verzweigung/Dichte: locker	Dekorative Wirkung Herbstlaub: mittel; Anhaften des Laubs im Winter: kein	* NL = *
H. x intermedia 'Harry'	Blütezeit: KW 1-12; Dauer: 11 Wochen; Auffälligkeit: hoch; Reichblütigkeit: stark; Dekorative Wirkung: hoch; Vorblüte: gering; Duft: gering; Farbe: orangegelb; Fruchtansatz: gering	Wuchsform: straff aufrecht; Wüchsigkeit: gering; Höhe: 105 (160); Breite: 110 (180); Verzweigung/Dichte: locker	Dekorative Wirkung Herbstlaub: mittel; Anhaften des Laubs im Winter: gering	** NL = **, UK = AGM
H. x intermedia 'Jelena'	Blütezeit: KW 52-10; Dauer: 10 Wochen; Auffälligkeit: hoch; Reichblütigkeit: stark; Dekorative Wirkung: hoch; Vorblüte: gering; Duft: gering; Farbe: orangerot, Spitze gelb Fruchtansatz: gering	Wuchsform: breit buschig; Wüchsigkeit: stark; Höhe: 145 (210); Breite: 165 (270); Verzweigung/Dichte: dicht	Dekorative Wirkung Herbstlaub: mittel; Anhaften des Laubs im Winter: gering	 *** NL = **, UK = AGM
(Syn. 'Copper Beauty')				
H. x intermedia 'Moonlight'	Blütezeit: KW 52-11; Dauer: 11 Wochen; Auffälligkeit: hoch; Reichblütigkeit: stark; Dekorative Wirkung: hoch; Vorblüte: fehlend - gering; Duft: mittel; Farbe: hellgelb; Fruchtansatz: gering	Wuchsform: kompakt; Wüchsigkeit: gering; Höhe: 115 (160); Breite: 150 (190); Verzweigung/Dichte: dicht	Dekorative Wirkung Herbstlaub: mittel; Anhaften des Laubs im Winter: stark	*
H. x intermedia 'Old Copper'	Blütezeit: KW 51-11; Dauer: 12 Wochen; Auffälligkeit: hoch; Reichblütigkeit: stark; Dekorative Wirkung: hoch; Vorblüte: gering; Duft: gering; Farbe: orangerot; Fruchtansatz: fehlend -gering	Wuchsform: breit buschig; Wüchsigkeit: stark; Höhe: 130 (200); Breite: 185 (270); Verzweigung/Dichte: dicht	Dekorative Wirkung Herbstlaub: mittel; Anhaften des Laubs im Winter: kein	**
H. x intermedia 'Orange Beauty'	Blütezeit: KW 52-12; Dauer: 12 Wochen; Auffälligkeit: hoch; Reichblütigkeit: stark; Dekorative Wirkung: hoch; Vorblüte: gering; Duft: gering; Farbe: orangegelb; Fruchtansatz: gering	Wuchsform: breit buschig; Wüchsigkeit: stark; Höhe: 115 (175); Breite: 170 (265); Verzweigung/Dichte: dicht	Dekorative Wirkung Herbstlaub: mittel; Anhaften des Laubs im Winter: kein	 ***
H. x intermedia 'Orange Peel'	Blütezeit: KW 1-10; Dauer: 9 Wochen; Auffälligkeit: hoch; Reichblütigkeit: mittel; Dekorative Wirkung: hoch; Vorblüte: fehlend - gering; Duft: mittel; Farbe: orangegelb; Fruchtansatz: fehlend - gering	Wuchsform: straff aufrecht - kompakt; Wüchsigkeit: sehr gering; Höhe: 95 (190); Breite: 80 (180); Verzweigung/Dichte: dicht	Dekorative Wirkung Herbstlaub: mittel; Anhaften des Laubs im Winter: kein	** NL = *
H. x intermedia 'Ostergold'	Blütezeit KW 5-14; Dauer: 9 Wochen; Auffälligkeit: hoch; Reichblütigkeit: stark; Dekorative Wirkung: hoch; Vorblüte: fehlend - gering; Duft: gering; Farbe: gelb; Fruchtansatz: fehlend - gering	Wuchsform: straff aufrecht; Wüchsigkeit: gering; Höhe: 120 (180); Breite: 155 (225); Verzweigung/Dichte: locker	Dekorative Wirkung Herbstlaub: mittel Anhaften des Laubs im Winter: kein	*



Ergebnisse des AK Bundesgehölzsichtung - Hamamelis

<i>H. x intermedia</i> 'Pallida'  (Syn. <i>H. mollis</i> 'Pallida')	<b>Blütezeit:</b> KW 2-11 KW; <b>Dauer:</b> 10 Wochen; <b>Auffälligkeit:</b> hoch; <b>Reichblütigkeit:</b> stark; <b>Dekorative Wirkung:</b> hoch; <b>Vorblüte:</b> fehlend – gering; <b>Duft:</b> mittel; <b>Farbe:</b> hellgelb; <b>Fruchtansatz:</b> gering	<b>Wuchsform:</b> straff aufrecht; <b>Wüchsigkeit:</b> gering; <b>Höhe:</b> 140 (160); <b>Breite:</b> 140 (190); <b>Verzweigung/Dichte:</b> locker	<b>Dekorative Wirkung</b> Herbstlaub: mittel; <b>Anhaften des Laubs im Winter:</b> gering	**  NL = **, UK = AGM
<i>H. x intermedia</i> 'Primavera'	<b>Blütezeit:</b> KW 3-12; <b>Dauer:</b> 9 Wochen; <b>Auffälligkeit:</b> hoch; <b>Reichblütigkeit:</b> stark; <b>Dekorative Wirkung:</b> hoch; <b>Vorblüte:</b> fehlend – gering; <b>Duft:</b> gering; <b>Farbe:</b> gelb - hellgelb; <b>Fruchtansatz:</b> gering	<b>Wuchsform:</b> kompakt; <b>Wüchsigkeit:</b> stark; <b>Höhe:</b> 120 (160); <b>Breite:</b> 145 (210); <b>Verzweigung/Dichte:</b> dicht	<b>Dekorative Wirkung</b> Herbstlaub: mittel; <b>Anhaften des Laubs im Winter:</b> gering	**
<i>H. vernalis</i> 'Quasimodo'	<b>Blütezeit:</b> KW 5-12; <b>Dauer:</b> 7 Wochen; <b>Auffälligkeit:</b> gering; <b>Reichblütigkeit:</b> stark; <b>Dekorative Wirkung:</b> gering; <b>Vorblüte:</b> fehlend; <b>Duft:</b> stark; <b>Farbe:</b> orange; <b>Fruchtansatz:</b> gering	<b>Wuchsform:</b> kompakt; <b>Wüchsigkeit:</b> gering; <b>Höhe:</b> 80 (120); <b>Breite:</b> 90 (95); <b>Verzweigung/Dichte:</b> dicht	<b>Dekorative Wirkung</b> Herbstlaub: hoch; <b>Anhaften des Laubs im Winter:</b> kein	s
<i>H. x intermedia</i> 'Robert'	<b>Blütezeit:</b> KW 5-10; <b>Dauer:</b> 12 Wochen; <b>Auffälligkeit:</b> hoch; <b>Reichblütigkeit:</b> stark; <b>Dekorative Wirkung:</b> hoch; <b>Vorblüte:</b> mittel; <b>Duft:</b> mittel; <b>Farbe:</b> kupferorange; <b>Fruchtansatz:</b> gering	<b>Wuchsform:</b> kompakt; <b>Wüchsigkeit:</b> stark; <b>Höhe:</b> 125 (180); <b>Breite:</b> 140 (240); <b>Verzweigung/Dichte:</b> dicht	<b>Dekorative Wirkung</b> Herbstlaub: hoch; <b>Anhaften des Laubs im Winter:</b> gering	**  UK = AGM
<i>H.</i> 'Rochester'	<b>Blütezeit:</b> KW 5-10; <b>Dauer:</b> 12 Wochen; <b>Auffälligkeit:</b> mittel; <b>Reichblütigkeit:</b> stark; <b>Dekorative Wirkung:</b> mittel; <b>Vorblüte:</b> fehlend – gering; <b>Duft:</b> stark; <b>Farbe:</b> orange; <b>Fruchtansatz:</b> fehlend - gering	<b>Wuchsform:</b> breit buschig; <b>Wüchsigkeit:</b> stark; <b>Höhe:</b> 110 (145); <b>Breite:</b> 160 (235); <b>Verzweigung/Dichte:</b> dicht	<b>Dekorative Wirkung</b> Herbstlaub: hoch; <b>Anhaften des Laubs im Winter:</b> stark	o  NL = s-*
<i>H. x intermedia</i> 'Rubin'  (Syn. <i>H. japonica</i> 'Rubin')	<b>Blütezeit:</b> KW 2-12; <b>Dauer:</b> 10 Wochen; <b>Auffälligkeit:</b> hoch; <b>Reichblütigkeit:</b> stark; <b>Dekorative Wirkung:</b> hoch; <b>Vorblüte:</b> gering; <b>Duft:</b> gering; <b>Farbe:</b> rot; <b>Fruchtansatz:</b> gering	<b>Wuchsform:</b> breit buschig; <b>Wüchsigkeit:</b> gering; <b>Höhe:</b> 100 (130); <b>Breite:</b> 145 (235); <b>Verzweigung/Dichte:</b> locker	<b>Dekorative Wirkung</b> Herbstlaub: mittel; <b>Anhaften des Laubs im Winter:</b> kein	*  UK = AGM
<i>H. x intermedia</i> 'Ruby Glow'	<b>Blütezeit:</b> KW 1-10; <b>Dauer:</b> 9 Wochen; <b>Auffälligkeit:</b> mittel; <b>Reichblütigkeit:</b> stark; <b>Dekorative Wirkung:</b> mittel; <b>Vorblüte:</b> fehlend – gering; <b>Duft:</b> gering; <b>Farbe:</b> blassrot; <b>Fruchtansatz:</b> gering	<b>Wuchsform:</b> straff aufrecht; <b>Wüchsigkeit:</b> stark; <b>Höhe:</b> 150 (200); <b>Breite:</b> 140 (200); <b>Verzweigung/Dichte:</b> dicht	<b>Dekorative Wirkung</b> Herbstlaub: hoch; <b>Anhaften des Laubs im Winter:</b> kein	**  NL = *
<i>H. vernalis</i> 'Sandra'	<b>Blütezeit:</b> KW 7-14; <b>Dauer:</b> 7 Wochen; <b>Auffälligkeit:</b> mittel; <b>Reichblütigkeit:</b> stark; <b>Dekorative Wirkung:</b> mittel; <b>Vorblüte:</b> fehlend; <b>Duft:</b> mittel; <b>Farbe:</b> orangegelb; <b>Fruchtansatz:</b> gering	<b>Wuchsform:</b> kompakt; <b>Wüchsigkeit:</b> sehr stark; <b>Höhe:</b> 175 (220); <b>Breite:</b> 180 (240); <b>Verzweigung/Dichte:</b> sehr dicht	<b>Dekorative Wirkung</b> Herbstlaub: hoch; <b>Anhaften des Laubs im Winter:</b> kein	s  NL = s
<i>H. x intermedia</i> 'Sunburst'	<b>Blütezeit:</b> KW 2-11; <b>Dauer:</b> 9 Wochen; <b>Auffälligkeit:</b> hoch; <b>Reichblütigkeit:</b> stark; <b>Dekorative Wirkung:</b> hoch; <b>Vorblüte:</b> fehlend; <b>Duft:</b> gering; <b>Farbe:</b> hellgelb; <b>Fruchtansatz:</b> gering	<b>Wuchsform:</b> straff aufrecht; <b>Wüchsigkeit:</b> stark; <b>Höhe:</b> 140 (200); <b>Breite:</b> 140 (205); <b>Verzweigung/Dichte:</b> locker	<b>Dekorative Wirkung</b> Herbstlaub: mittel; <b>Anhaften des Laubs im Winter:</b> gering	**
<i>H. x intermedia</i> 'Swallow Hayes'	<b>Blütezeit:</b> KW 2-12; <b>Dauer:</b> 9 Wochen; <b>Auffälligkeit:</b> hoch; <b>Reichblütigkeit:</b> stark; <b>Dekorative Wirkung:</b> hoch; <b>Vorblüte:</b> fehlend – gering; <b>Duft:</b> mittel; <b>Farbe:</b> hellgelb; <b>Fruchtansatz:</b> gering	<b>Wuchsform:</b> straff aufrecht; <b>Wüchsigkeit:</b> stark; <b>Höhe:</b> 125 (160); <b>Breite:</b> 135 (235); <b>Verzweigung/Dichte:</b> dicht	<b>Dekorative Wirkung</b> Herbstlaub: mittel; <b>Anhaften des Laubs im Winter:</b> kein	**
<i>H. x intermedia</i> 'Twilight'	<b>Blütezeit:</b> KW 1-11; <b>Dauer:</b> 10 Wochen; <b>Auffälligkeit:</b> hoch; <b>Reichblütigkeit:</b> mittel; <b>Dekorative Wirkung:</b> hoch; <b>Vorblüte:</b> gering; <b>Duft:</b> gering; <b>Farbe:</b> orangerot, Spitzen orange; <b>Fruchtansatz:</b> fehlend	<b>Wuchsform:</b> straff aufrecht – kompakt; <b>Wüchsigkeit:</b> gering; <b>Höhe:</b> 75 (80); <b>Breite:</b> 100 (120); <b>Verzweigung/Dichte:</b> locker	<b>Dekorative Wirkung</b> Herbstlaub: mittel; <b>Anhaften des Laubs im Winter:</b> gering	**
<i>H. vernalis</i> 'Washington Park'	<b>Blütezeit:</b> KW 2-11; <b>Dauer:</b> 9 Wochen; <b>Auffälligkeit:</b> mittel; <b>Reichblütigkeit:</b> stark; <b>Dekorative Wirkung:</b> mittel; <b>Vorblüte:</b> fehlend; <b>Duft:</b> gering; <b>Farbe:</b> rotviolett; <b>Fruchtansatz:</b> gering	<b>Wuchsform:</b> breit buschig; <b>Wüchsigkeit:</b> stark; <b>Höhe:</b> 110 (210); <b>Breite:</b> 135 (240); <b>Verzweigung/Dichte:</b> dicht	<b>Dekorative Wirkung</b> Herbstlaub: hoch; <b>Anhaften des Laubs im Winter:</b> gering	*
<i>H. x intermedia</i> 'Westerstede'	<b>Blütezeit:</b> KW 4-13; <b>Dauer:</b> 9 Wochen; <b>Auffälligkeit:</b> hoch; <b>Reichblütigkeit:</b> stark; <b>Dekorative Wirkung:</b> hoch; <b>Vorblüte:</b> fehlend – gering; <b>Duft:</b> gering; <b>Farbe:</b> gelb; <b>Fruchtansatz:</b> mittel	<b>Wuchsform:</b> straff aufrecht; <b>Wüchsigkeit:</b> stark; <b>Höhe:</b> 120 (160); <b>Breite:</b> 125 (165); <b>Verzweigung/Dichte:</b> dicht	<b>Dekorative Wirkung</b> Herbstlaub: mittel; <b>Anhaften des Laubs im Winter:</b> kein	**  NL = *

Ergebnisse des AK Bundesgehölzsichtung - *Hamamelis*

Tab. 2: Blüten der vom Arbeitskreis Bundesgehölzsichtung geprüften Zaubernuss-Sorten.



'Advent' \*\*



'Allgold' \*



'Amethyst' \*



'Angelly' \*\*\*



Ergebnisse des AK Bundesgehölzsichtung - *Hamamelis*



'Arnold Promise' \*\*



'Barmstedt Gold' \*\*\*



'Bernstein' \*\*



'Brandis' \*\*



Ergebnisse des AK Bundesgehölzsichtung - *Hamamelis*



'Cyrille' \*



'Diane' \*\*



'Doerak' O



'Duftzauber' \*\*



Ergebnisse des AK Bundesgehölzsichtung - *Hamamelis*



'Feuerzauber' \*



'Harry' \*\*



'Jelena' \*\*\*



'Moonlight' \*



Ergebnisse des AK Bundesgehölzsichtung - *Hamamelis*



'Old Copper' \*\*



'Orange Beauty' \*\*\*



'Orange Peel' \*\*



'Ostergold' \*



Ergebnisse des AK Bundesgehölzsichtung - *Hamamelis*



'Pallida' \*\*



'Primavera' \*\*



'Quasimodo' S



'Robert' \*\*



Ergebnisse des AK Bundesgehölzsichtung - *Hamamelis*



'Rochester' O



'Rubin' \*



'Ruby Glow' \*\*



'Sandra' S



Ergebnisse des AK Bundesgehölzsichtung - *Hamamelis*



'Sunburst' \*\*



'Swallow Hayes' \*\*



'Twilight' \*\*



'Washington Park' \*



Ergebnisse des AK Bundesgehölzsichtung - *Hamamelis*



'Westerstede' \*\*

**Kultur- und Versuchshinweise**

Start der Sichtung: 2016; Ende der Sichtung: 2020

Anzahl Sorten: 33, davon 29 *Hamamelis x intermedia*, 4 *Hamamelis vernalis*

Pflanzen pro Sorte und Standort: 3; Pflanzung: 06.05.2021, Pflanzabstand: 2 x 2 m

Kulturmaßnahmen: Keine besonderen Maßnahmen, event. Beregnung bei starker Trockenheit



**Abb. 4:** *Hamamelis* verzaubert den winterlichen Prüfgarten in Ellerhoop in ein Blütenmeer

## Ergebnisse des AK Bundesgehölzsichtung - *Hamamelis*

---

### Kritische Anmerkungen

---

#### Literatur:

HOUTMANN, R.T und W.F VAN DER WERF (2002): *Hamamelis* sortimentsonderzoek en keuringsrapport. *Dendroflora* 39: 30-61

ERHARD. W; E. GÖTZ; N. BÖDECKER und S. SEYBOLD (2008): *Der große Zander – Enzyklopädie der Pflanzennamen*. Band 1: Familien und Gattungen. Eugen Ulmer, Stuttgart.

LANE, C. (2005): *Witch Hazels* (Royal Horticultural Society Plant Collector Guide )

LANE, C (2021): <http://witchhazelnursery.com/>

NAMENLISTE GEHÖLZE (2021): [http://www.internationalplantnames.com/HTML/Deutsch/index\\_zoek.htm](http://www.internationalplantnames.com/HTML/Deutsch/index_zoek.htm)

RHS (2021): <http://apps.rhs.org.uk/agm/Award2.asp?User2=T%26S&crit=hamamelis>

**Bildnachweis:** Alle Fotos © LKSH, Gartenbau