

Apfelsorten (Auswahl) entstanden vor 1800 n. Chr.

Name, Sorte	Synonyme	Entstehungsjahr	Bemerkungen	Angebot	
Gormaringer Geroldinger	Gosmaringer	vor 850 vor 850	im Capitulare de villis genannt im Capitulare de villis genannt	verschollen verschollen	
Krewedellen Spirauker	Krewedellen Speieräpfel	vor 850 vor 850	im Capitulare de villis genannt im Capitulare de villis genannt	verschollen verschollen	
Borsdorfer		12 Jahrh.	bei Jena in einem Kloster entstanden	verschollen	
Graue Renette	Graue franz. Renette, Graurennetten, Graue Herbstrenette, Herrengast, Lederapfel,	Rauchapfel, Winterrabau, Grauer Kurzstiel, Grauer Rabaus, Pelzapfel	ungewiss, bereits bekannt im 16. Jahrh.	Wuchs stark bis sehr stark	bei normalen Baumschulen zu erhalten
Roter Eiserapfel	Christapfel, Eisapfel, Herzapfel, Klosterapfel, Nägelesapfel, Roter Krieger, Paradiesapfel,	Bamberger, Brasilienapfel, Roter Winterkalvill, Zigeunerapfel, Möhrenkopf, Schornsteinfeger	schon bekannt im 16. Jahrh.	Herkunft vermutlich Nähe Nürnberg, sehr kräftiger Wuchs	bei normalen Baumschulen zu erhalten
Welschisner	Brünnerling, Roter Zwiebelapfel, Prinerapfel, Böhm. Wilhelmsapfel,	Früher Welschnisner, Großer Böhmischer, Brünnerling, Jahrapfel	1659 als Prinerapfel beschrieben	Entstehung ungewiss, vermutlich Deutschland, Wuchs sehr stark, bei Vollertrag mittel bis stark	nur bei Spezialbaumschulen zu erhalten
Roter Herbstkalvill	Blutapfel, Fürstenblut, Brautapfel, Edelkönig, Himbeerapfel, Innenrötling, Rasselapfel,	Roter Kardinal, Erdbeerapfel, Jungfernapfel, Kirschapfel, Rosenapfel, Roter Paradiesapfel	vor 1670	Wuchs anfangs stark, bei Vollertrag schwächer	nur bei Spezialbaumschulen zu erhalten
Muskatrenette Goldparmäne	Muskatellerrenette,	Gewürzrenette, Margil	Entstehung ungewiss, schon bekannt im 17. Jahrh. 1700	schwacher Wuchs kleinkronig, sehr früh tragend	nur noch aus Lehr- und Versuchsgärten zu erhalten bei normalen Baumschulen zu erhalten
Fameuse Danziger Kantapfel	Chimney Apple, Du Maréchal, Pomme Fameuse, Schwäbischer Rosenapfel	Sanguineuse, Schneeapfel, Snow Chimney	1730 um 1760	Aus Samen, die von den ersten Siedlern von Frankreich nach Amerika gebracht wurden, Pflanzjahr 1730 am Chimney Point, in der Nähe von Vermont, Wuchs mittelstark Herkunft unbekannt	nur noch aus Lehr- und Versuchsgärten zu erhalten bei normalen Baumschulen zu erhalten
Kanada Renette	Butterapfel, Canada Blanc, Lederapfel,	Pariser Rambur, Rabau, Rostapfel, Schmalzapfel	in Frankreich schon 1771 beschrieben	starker Wuchs	nur bei Spezialbaumschulen zu erhalten
Gelber Bellefleur	Belle Flavioise, Blumenkalvill, Linous Pepping, Metzgerapfel, Yellow Bellflower,	Weidenapfel, Schafsnase, Thüringer Graven- steiner	Wahrscheinlich um 1790	Wuchs mittelstark Herkunft New Jersey	bei normalen Baumschulen zu erhalten
Gravensteiner	Blumenkalvill, Ernteapfel, Sommerkönig, Strömmling,	Sommerkalvill, Haferapfel, Grafenapfel, Diels	schon beschrieben im 18. Jahrh.	Zufallssämling, wahrscheinlich von Schloss Graafenstein in Dänemark, Wuchs stark bis sehr stark	bei normalen Baumschulen zu erhalten
Rote Sternrenette	Calville Etoilée, Herzapfel,	Meusers Rote Herbstrenette	Entstehung ungewiss, jedoch seit mindestens 200 Jahren bekannt (vor 1790)	Wuchs anfangs schwächer, dann zunehmend stärker	bei normalen Baumschulen zu erhalten
Bohnapfel Rheinischer Krummstiel			vor etwa 200 Jahren (vor 1790) über 200 Jahre (vor 1790)	vermutlich im Neuwieder Becken entstanden	bei normalen Baumschulen zu erhalten bei normalen Baumschulen zu erhalten
Winterrambur	Rheinischer Winterrambur, Jägerapfel,	Teuringer Rambur, Menzenauer	vor 1800 sehr alte Sorte	Entstehung ungewiss, Belgien o. Niederlande, Wuchs anfangs stark, bei Vollertrag mittelstark	bei normalen Baumschulen zu erhalten